

BORKO M. MATIJEVI^{1*}, ENIJA VAŠTAG¹,
 SUZANA LJ. APOSTOLOV¹, JADRANKA A. TOT¹,
 FATHI ASSALEH², ALEKSANDAR D. MARINKOVIĆ²

¹Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i
 zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,

²Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd,
 Srbija

Naučni rad

UDC:687.652

doi:10.5937/ZasMat1503279M



Zastita Materijala 56 (3)

279 – 288 (2015)

Proučavanje fizičko-hemijskih svojstava novosintetisanih derivata uracila

IZVOD

Derivati uracila predstavljaju potencijalno biološki aktivna jedinjenja, pa je ispitivanje njihovih fizičko-hemijskih svojstava veoma značajno za njihovu dalju primenu. U ovom radu je ispitana serija novosintetisanih derivata uracila primenom spektrofotometrijske metode. Apsorpcioni spektri su snimljeni u sedamnaest rastvara a različitim svojstava. Uticaj rastvara a na apsorpcione spekture tumačen je primenom Kamlet-Taft-ovog solvatochromnog modela. Dominantnost i vrste interakcija koje se javljaju između ispitivanih derivata i rastvara a analizirane su metodom višestrukog linearne korelacije dobijenih vrednosti položaja apsorpcionih maksimuma i Hansen-ovih parametara rastvara a. Pored uticaja rastvara a, tumačen je i uticaj supstituenta prisutnog u molekulu na apsorpcione spekture pomoću Hammett-ove jednačine.

Ključne reči: derivati uracila, solvatochromizam, uticaj supstituenta, spektrofotometrija, koreaciona analiza

1. UVOD

Uracil i njegovi derivati su veoma bitna jedinjenja za žive organizme jer su neophodni za sintezu kao i rad mnogih enzima i koenzima. U estvuju u nastajanju visoko energetskih fosfatnih jedinjenja analognih adenozin-5'-trifosfatu, guanin-5'-trifosfatu i inozin-5'-trifosfatu [1-3].

Derivati uracila pored navedenih osnovnih uloga imaju i druge veoma značajne primene: kao baktericidi [4-6], u hemioterapijske svrhe [7-9], za usporavanje širenja akutne limfatične leukemije, normalizaciju i smanjenje broja malignih elija u limfoproliferativnim hroničnim oboljenjima [10-12], kao potencijalni lekovi u borbi protiv HIV-1 virusa [13,14]. Pored toga što imaju veliku primenu u medicini, mogu da se koriste i za dobijanje PVC materijala koji se koriste kao topotni stabilizatori [15]. Broj fiziološki aktivnih derivata uracila se neprestano povećava, a samim tim se širi i njihova mogućnost primene.

Primena derivata uracila, kao i svih molekula, zavisi i od njihovih solvatochromnih osobina tj. interakcija koje se javljaju između molekula jedinjenja i okolnog medijuma. Pogodna metoda za proučavanje ovih vrsta interakcija je UV/Vis apsorpciona spektrofotometrija. U zavisnosti od osobina rastvara a i njegove sposobnosti da stupa u razne fizičke ili hemijske interakcije sa rastvorenom supstancom dolazi do energetskih promena u samom molekulu, a samim tim i do promena u apsorpcionom spektru datog jedinjenja u odnosu na spektor u gasovitom stanju. Ovaj fenomen naziva se solvatochromizam i on je esto korišten za proučavanje strukture i reaktivnosti mnogih organskih jedinjenja metodom linearne korelacije solvatochromnih energija (LSER). Cilj ovog rada je dobijanje informacija o solvatochromnih svojstava potencijalno biološki aktivnih novosintetisanih derivata uracila koji su veoma bitne za njihovu dalju mogućnost primene. Pored ispitivanja solvatochromnih svojstava, proučen je i uticaj hemijske strukture na spektralno ponašanje odabralih derivata.

2. EKSPERIMENTALNI DEO

2.1. Sinteza i karakterizacija 6-(4-supstituisanih fenilimino)metil uracila


Sintetisana je serija od deset 6-((4-supstituisanih fenilimino)metil)pirimidin-2,4(1H,3H)-diona (6-(4-supstituisani fenilimino)metil uracila) koji su dobijeni kondenzacijom uracil-6-karboksaldehida i odgovarajućih 4-supstituisanih anilina uz refluks u apsolutnom metanolu u trajanju od jednog asa, pri čemu su dobijeni proizvodi opštih formule dati na slici 1.

Autor za korespondenciju: Borko Matijević
 E-mail: borko.matijevic@dh.uns.ac.rs

Rad primljen: 12. 03. 2015.

Rad prihvat: 23. 04. 2015.

Rad je dostupan na sajtu: www.idk.org.rs/casopis



Slika 1 – Struktura ispitivanih derivata 6-(4-supstituisanih fenilimino)metil uracila

Karakterizacija sintetisanih jedinjenja ura ena je snimanjem njihovih ^1H i ^{13}C NMR spektara pomoću Bruker AC 250 spektrofotometra na 62,896 MHz. Spektri su snimani na sobnoj temperaturi u deuterisanom dimetil slufoksidu ($\text{DMSO}-d_6$). Hemiska pomeranja izražena su u ppm () u odnosi

su na signal rastvra a TMS ($\delta = 0,0$ ppm) u ^1H NMR spektrima i ($\delta = 39,5$ ppm) u ^{13}C NMR spektrima. Hemiska pomeranja određena su korišćenjem komplementarne DEPT-, dvodimenzionalne ^1H - ^{13}C korelacije HETCOR i selektivnih INEPT eksperimenata. Za sva sintetisana jedinjenja određene su temperature formiranja i topljenja. Svi rezultati karakterizacije ispitivanih jedinjenja prikazani su u tabeli 1.

Polazne konformacije ispitivanih jedinjenja su generisane korišćenjem ISIS Draw 2.5 programa, i optimizovana na MO semi-empirijskom nivou, korišćenjem PM6 metoda [16], kako bi se dobije vrednost srednjeg kvadrata ispod 0,01 kcal/mol, uz simuliranje implicitne solvatacije DMSO rastvara a (COSMO) (EF, GNORM = 0,01, DIPOLE = 48) korišćenjem MOPAC2012™ programske pakete. VEGA ZZ 3.0.1 je korišćena kao grafički interfejs (graphical user interface - GUI) [17]. Potpuna optimizacija geometrije je izvršena pomoću Gaussian03 programske pakete [18], primenom teorije funkcionala gustine (density functional theory - DFT) korišćenjem B3LYP/6-311G.

Tabela 1 – Podaci karakterizacije ispitivanih jedinjenja

broj	R	Temperatura formiranja, °C	Temperatura topljenja, °C	Hemiski pomeraji u NMR spektrima, ppm
1	H	-89,135	266-267	^1H NMR (CDCl_3): 6,085 (N_1H), 7,504 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,702 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 105,38 (C_5), 147,62 (C_6), 151,10 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 153,26 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,44 (C_4)
2	F	-89,667	284-285	^1H NMR (CDCl_3): 6,069 (N_1H), 8,369 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,683 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 105,38 (C_5), 147,27 (C_6), 151,06 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 152,94 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,40 (C_4)
3	Cl	-51,941	303-305	^1H NMR (CDCl_3): 6,08 (N_1H), 8,369 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,739 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 105,70 (C_5), 147,16 (C_6), 151,06 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 154,00 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,37 (C_4)
4	Br	-40,408	277-279	^1H NMR (CDCl_3): 6,086 (N_1H), 8,369 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,759 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 105,76 (C_5), 147,20 (C_6), 151,08 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 154,08 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,40 (C_4)
5	I	-26,750	260-261	^1H NMR (CDCl_3): 6,086 (N_1H), 8,358 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,736 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 105,72 (C_5), 147,20 (C_6), 151,08 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 153,92 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,40 (C_4)
6	CH_3	-52,696	289-291	^1H NMR (CDCl_3): 6,055 (N_1H), 8,363 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,635 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 104,98 (C_5), 147,44 (C_6), 151,06 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 153,92 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,45 (C_4)
7	OCH_3	-85,849	272-273	^1H NMR (CDCl_3): 6,024 (N_1H), 8,375 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,562 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 104,51 (C_5), 147,62 (C_6), 151,08 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 149,75 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,52 (C_4)
8	COCH_3	-	249-250	^1H NMR (CDCl_3): 6,131 (N_1H), 8,369 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,821 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 106,21 (C_5), 147,04 (C_6), 151,08 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 155,40 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,30 (C_4)
9	NO_2	-88,562	>300	^1H NMR (CDCl_3): 5,656 (N_1H), 8,074 ($\text{CH}=\text{N}$), 11,017 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 106,82 (C_5), 146,72 (C_6), 151,06 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 156,51 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,18 ($\text{C}_4=\text{O}$)
10	OH	-90,568	284-285	^1H NMR (CDCl_3): 5,996 (N_1H), 8,338 ($\text{CH}=\text{N}$), 10,503 (N_3H); ^{13}C NMR (CDCl_3): 104,19 (C_5), 147,78 (C_6), 151,15 (C_2 , $\text{C}=\text{O}$), 148,53 ($\text{CH}=\text{N}$), 164,40 (C_4)

2.2. Spektralna analiza

U ovom radu ispitivane su solvatochromne osobine kao i uticaj supstituenta u strukturi novosintetisanih derivata spektrofotometrijskom metodom.


Apsorpcioni spektri snimljeni su u 17 rastvara a: dejonizovana voda, metanol (*Backer*), etanol (*Backer*), *n*-propanol (*Merck*), *i*-propanol (*Merck*), *n*-butanol (*Kemika Zagreb*), *i*-butanol (*Merck*), *t*-butanol (*Merck*), *n*-pentanol (*Backer*), sir etna kiselina (*Merck*), *n*-heksan (*Merck*), *n*-heptan (*Merck*), acetonitril (*Backer*), dioksan (*Merck*), dimetilsulfoksid, DMSO (*Merck*), N,N-dimetilformamid, DMF (*Sigma Aldrich*) i hloroform (*Sigma Aldrich*). Svi rastvara i su bili visokog stepena isto i kvaliteta za spektrofotometrijska ispitivanja. Pripremljeni su rastvor za snimanje, rastvaranjem svake supstance u svakom rastvara u do koncentracije $4 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³.

Snimanje je vršeno pomoću spektrofotometra *Cintra 1010* u opsegu talasnih dužina od 200-500 nm na sobnoj temperaturi, a podaci su obrađeni pomoću programa *Origin 6.1*. Položaji apsorpcionih traka su mereni na maksimumu apsorpcije, λ_{max} (nm), a talasni brojevi (cm⁻¹) su izračunati na osnovu relacije $\lambda_{max} = 1 / \nu_{max}$.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. Uticaj rastvra a na apsorpcione spektre derivata uracila

Na slici 2 prikazani su apsorpcioni spektri 6-(4-hlor fenilimino)metil uracila u protini (a) i aprotini (b) rastvara ima. Dobijeni su slični apsorpcioni spektri za sve ostale ispitivane derive, a brojane vrednosti o itanima apsorpcionih frekvencija na maksimumu apsorbancije za sve korištene rastvare su prikazani su u tabelama 2 i 3.



Slika 2 – Apsorpcioni spektri 6-(4-hlor fenilimino)metil uracila u a) proti nim i b) aproti nim rastvara ima


Tabela 2 – Vrednosti apsorpcionih frekvencija na maksimumu apsorbancije, $\lambda_{max} 10^3$, cm⁻¹ u proti nim rastvra ima

jedinjenje	voda	metanol	etanol	<i>n</i> -propanol	<i>i</i> -propanol	<i>n</i> -butanol	<i>i</i> -butanol	<i>t</i> -butanol	<i>n</i> -pentanol	sir etna kiselina
1	34,99	34,09	33,94	33,93	33,94	34,09	34,00	33,95	33,68	34,06
2	34,74	33,98	33,85	33,86	33,94	33,80	33,75	33,71	33,34	33,92
3	34,74	34,09	33,94	33,91	33,94	33,80	33,78	33,73	33,85	33,97
4	34,68	34,08	33,94	33,96	33,94	33,82	33,77	33,71	33,91	33,92
5	34,65	34,09	33,96	33,91	33,98	33,79	33,74	33,67	33,72	33,97
6	34,57	33,65	33,59	33,55	33,54	33,48	33,45	33,39	33,52	33,70
7	33,31	32,73	32,79	32,67	32,64	32,60	32,56	32,49	32,58	32,90
8	34,70	33,58	33,48	33,75	33,78	32,71	32,70	32,66	32,62	32,78
9	28,78	28,63	28,31	28,12	28,31	28,22	28,20	28,14	28,15	28,38
10	33,08	32,50	32,54	32,46	32,45	32,37	32,33	32,37	32,41	32,67

Tabela 3 – Vrednosti apsorpcionih frekvencija na maksimumu apsorbancije, $\nu_{\text{max}} \cdot 10^3, \text{cm}^{-1}$ u aproti nim rastvra ima

jedinjenje	acetonitril	dioksan	n-heksan	n-heptan	DMSO	DMF	Hloroform
1	33,73	33,59	31,73	31,86	34,31	34,52	33,73
2	33,88	33,54	31,15	31,28	34,88	34,97	33,75
3	33,88	33,38	32,25	32,30	34,15	34,25	33,53
4	33,88	33,30	32,41	32,50	34,18	34,26	33,58
5	33,96	33,78	32,27	32,32	34,45	34,52	33,68
6	33,65	33,31	31,53	31,59	34,15	34,24	33,04
7	32,92	32,72	31,49	31,54	33,10	33,16	32,52
8	33,84	32,60	30,96	31,03	33,87	33,96	32,78
9	28,52	28,13	-	-	28,54	28,67	28,30
10	32,64	32,48	-	-	32,89	32,91	32,56

Iz prikazanih spektara u ovom se prisustvo dva apsorpciona maksimuma. Jedan se javlja u oblasti oko 220 nm, a drugi od 285 do 355 nm u zavisnosti od korištenog rastvara a. U daljem razmatranju je uzet samo drugi apsorpcioni maksimum jer prvi nije bilo moguće registrovati u svim rastvraima usled apsorpcije rastvra a u tom delu spektra. Drugi apsorpcioni maksimum odgovara ν_{max} u prelazu u molekulu. Sa povećanjem polarnosti rastvara a traka koja se javlja u spektru usled ν_{max} u prelazu u molekulu se pomera hipsochromno [19]. Uticaj polarnosti rastvara a na apsorpcione spektre ispitivanih derivata uracila je u skladu sa iznetim teorijskim pravilom što potvrđuje da ove apsorpcione trake upravo potiču u od ovih prelaza u molekulu. Ovo ilustruje slika 3 na kojoj je prikazana zavisnost apsorpcionih frekvencija, $\nu_{\text{max}} \cdot 10^3$, od empirijskog parametra polarnosti rastvara a E_T^N [20]. Sa prikazane slike 3 se vidi da sa povećanjem polarnosti rastvara a, postoji trend povećanja apsorpcionih frekvencija, ν_{max} , odnosno smanjenje talasne dužine na maksimumu apsorbacije, λ_{max} , što se registruje kao hipsochromno pomeranje.



Slika 3 – Zavisnost $\nu_{\text{max}} \cdot 10^3$ od empirijskog parametra polarnosti rastvra a E_T^N za 6-(4-hlor-fenil)-iminometil-1H-uracil

Jedan od najčešćih primenjivanih solvatochromnih modela jeste Kamlet-Taft-ov [21] koji je korišten i u ovom radu, a definisan je jedna inom:

$$\nu = \nu_0 + s^* + a + b \quad (1)$$

gde su: ν frekvencija u datom rastvra u, ν_0 frekvencija u standardnom rastvra u, s^* kiselost, baznost i b polarizabilnost rastvra a [22-24].

Korelacijom vrednosti apsorpcionih frekvencija (tabele 2 i 3) sa empirijskim parametrima korištenih rastvra a (tabela 4) po modelu Kamlet-Taft-a (jedna ina 1) metodom višestruke linearne korelacije slobodnih energija dobijene su solvatochromne jednaine za sva ispitivana jedinjenja, osim za jedinjenje 9. Dobijene vrednosti regresionih koeficijenata s, a i b prikazane su u tabeli 5 kao i parametri korelacija.

Tabela 4 – Empirijski parametri rastvra a Kamlet-Taft-ovog solvatochromnog modela

rastvra i	s^*	a	b
voda	1,09	1,17	0,47
metanol	0,54	0,86	0,75
etanol	0,60	0,98	0,66
n-propanol	0,52	0,84	0,90
i-propanol	0,48	0,76	0,84
n-butanol	0,47	0,84	0,84
i-butanol	0,40	0,69	0,80
t-butanol	0,41	0,42	0,93
n-pentanol	0,40	0,84	0,86
sir etna kiselina	0,64	1,12	0,45
acetonitril	0,75	0,19	0,40
dioksan	0,55	0	0,37
n-heksan	-0,04	0	0
n-heptan	-0,08	0	0
DMSO	1	0	0,76
DMF	0,88	0	0,69
Hloroform	0,58	0,44	0

Tabela 5 – Regresioni koeficijenti Kamlet-Taft-ove solvatochromne jednačine za sve rastvara e

jedinjenje	$\text{o} \cdot 10^3, \text{cm}^{-1}$	$\text{s} \cdot 10^3, \text{cm}^{-1}$	$\text{a} \cdot 10^3, \text{cm}^{-1}$	$\text{b} \cdot 10^3, \text{cm}^{-1}$	r^2	sd	F	Rastvara i izuzeti iz korelacije
1	32,078 ($\pm 0,136$)	1,989 ($\pm 0,197$)	0,409 ($\pm 0,145$)	0,708 ($\pm 0,200$)	0,938	0,225	66	-
2	31,587 ($\pm 0,156$)	2,767 ($\pm 0,227$)	/ ^a	0,992 ($\pm 0,229$)	0,949	0,258	80	-
3	32,402 ($\pm 0,056$)	1,504 ($\pm 0,081$)	0,386 ($\pm 0,060$)	0,546 ($\pm 0,082$)	0,982	0,092	237	-
4	32,539 ($\pm 0,060$)	1,364 ($\pm 0,088$)	0,350 ($\pm 0,064$)	0,509 ($\pm 0,089$)	0,975	0,100	168	-
5	32,483 ($\pm 0,069$)	1,740 ($\pm 0,100$)	0,132 ($\pm 0,073$)	0,520 ($\pm 0,101$)	0,974	0,114	161	-
6	31,749 ($\pm 0,070$)	2,044 ($\pm 0,102$)	0,217 ($\pm 0,075$)	0,767 ($\pm 0,103$)	0,982	0,116	241	-
7	31,674 ($\pm 0,061$)	1,385 ($\pm 0,089$)	0,094 ($\pm 0,065$)	0,274 ($\pm 0,090$)	0,964	0,101	115	-
8	31,136 ($\pm 0,204$)	2,687 ($\pm 0,299$)	0,489 ($\pm 0,241$)	0,424 ($\pm 0,315$)	0,911	0,339	41	sir etna kiselina
9	/ ^a	/ ^a	/ ^a	/ ^a	/ ^a	/ ^a	/ ^a	-
10	31,930 ($\pm 0,075$)	1,036 ($\pm 0,074$)	0,051 ($\pm 0,038$)	/ ^a	0,953	0,056	74	heksan, heptan

r – koeficijent korelacije; sd – standardna devijacija; F – fišerov test da ne verovatno e; a – male vrednosti sa velikom standardnom greškom

Dobijeni rezultati pokazuju postojanje dobre korelacije (0,911 – 0,982) apsorpcionih frekvencija ispitivanih derivata uracila i solvatochromnih parametara korišćenih rastvara a, uspostavljene prime-nom Kamlet-Taft-ovog modela, izuzev kod jedinjenja 9 gde nije dobijena dobra korelacija.

Iz tabele 5 se vidi da su dobijene najveće apsolutne vrednosti za koeficijent s, što ukazuje da polarizabilnost rastvara a ima najveći uticaj na solvatochromizam ispitivanih derivata uracila. Pozitivan predznak ispred odgovarajućih parametara (s, a ili b) označava da se može očekivati hipsochromno pomeranje, dok negativan predznak predstavlja indikaciju za bathochromno pomeranje apsorpcionih maksimuma u slučaju porasta, kiselosti, baznosti ili polarizabilnosti rastvara a. Kod svih ispitivanih jedinjenja dobijen je pozitivan predznak koeficijenata s, a i b što je pokazatelj očekivanog hipsochromnog pomeranja njihovih apsorpcionih traka sa porastom kiselosti, baznosti i polarizabilnosti okolnog medijuma.


Uočljivi uticaj prirode primenjenih rastvara a na solvatochromizam proučavanih uracila je uvid u izračunavanjem procentnih udela pojedinih solvatochromnih parametara. Procentni udeli solvatochromnih parametara izračunati na osnovu rezultata Kamlet-Taft-ovog modela prikazani su u tabeli 6 i

pokazuju da je po ovom modelu polarizabilnost između ispitivanih molekula i rastvara a najodgovornija za solvatochromno ponašanje ispitivanih jedinjenja, dok kisele i bazne osobine rastvara a imaju veoma mali uticaj na njihovo solvatochromno ponašanje.

Tabela 6 – Procentni udeli solvatochromnih parametara po Kamlet-Taft-ovom modelu

jedinjenje	Ps(%)	Pa(%)	Pb(%)
1	64,04	13,17	22,79
2	73,61	0,00	26,39
3	61,74	15,84	22,41
4	61,36	15,74	22,90
5	72,74	5,52	21,74
6	67,50	7,17	25,33
7	79,01	5,36	15,63
8	74,64	13,58	11,78
9	-	-	-
10	95,31	4,69	0,00

Dobijena linearna zavisnost između eksperimentalno dobijenih vrednosti apsorpcionih frekvencija, exp i vrednosti koje su izračunate primenom jednacine 1, izr (slika 4) potvrđuje ispravnost primjenjenog Kamlet-Taft-ovog solvatochromnog modela za ispitivane derivate.

Slika 4 – Zavisnost v_{max} od d

Primenom metode višestruke linearne korelacije po jedna ina:

$$= o + d_d + p_p + h_h \quad (2)$$

nastavljeno je detaljnije ispitivanje uticaja rastvra a na apsorpcione spektre derivata uracila, a u cilju da se utvrdi dominantnost vrste interakcija između ispitivanog jedinjenja i okolnog medijuma (interakcije rastvorak-rastvara).

d , p , h su Hansenovi parametri rastvra a koji opisuju jačinu disperzionih, dipolnih interakcija kao i mogućnost građenja vodonikne veze, respektivno, a d , p i h su regresioni koeficijenti date jedna ina.

Broj a ne vrednosti korisnih Hansenovih parametara date su u tabeli 7 [25].

Tabela 7 – Hansen-ovi parametri rastvara a

broj	rastvra	d	d	h
1	voda	15,5	16,0	42,3
2	metanol	15,8	8,8	19,4
3	etanol	14,7	12,3	22,3
4	n-propanol	16,0	6,8	17,4
5	i-propanol	15,8	6,1	16,4
6	n-butanol	16,0	5,7	15,8
7	i-butanol	15,1	5,7	15,9
8	t-butanol	16,0	5,7	15,8
9	n-pentanol	15,9	4,5	13,9
10	sir etna kiselina	14,5	8,0	13,5
11	acetonitril	15,3	18,0	6,1
12	dioksan	19,0	1,8	7,4
13	n-heksan	14,9	0	0
14	n-heptan	15,3	0	0
15	DMSO	18,4	16,4	10,2
16	DMF	17,4	13,7	11,3
17	hloroform	17,8	3,1	5,7

U tabeli 8 date su broj a ne vrednosti dobijenih koeficijenata korelacijskih Hansen-ovih parametara sa vrednostima apsorpcionih frekvencija na maksimumu apsorpcije u ispitivanim rastvraima.

Tabela 8 – Regresioni koeficijenti jedna ina 2 za sve rastvara e

Jediničenje	$o \cdot 10^3$, cm $^{-1}$	$d \cdot 10^3$, cm $^{-1}$	$p \cdot 10^3$, cm $^{-1}$	$h \cdot 10^3$, cm $^{-1}$	r^2	sd	F	Rastvara i izuzeti iz korelacijske*
1	25,096 ($\pm 1,657$)	0,465 ($\pm 0,103$)	0,064 ($\pm 0,019$)	0,051 ($\pm 0,010$)	0,914	0,311	32	7,10,12,15
2	25,702 ($\pm 1,429$)	0,429 ($\pm 0,089$)	0,064 ($\pm 0,018$)	0,050 ($\pm 0,010$)	0,902	0,330	34	10,12
3	28,905 ($\pm 1,293$)	0,243 ($\pm 0,081$)	0,054 ($\pm 0,015$)	0,038 ($\pm 0,008$)	0,893	0,250	28	10,12,15
4	29,270 ($\pm 1,155$)	0,228 ($\pm 0,072$)	0,049 ($\pm 0,013$)	0,034 ($\pm 0,007$)	0,896	0,223	29	10,12,15
5	29,516 ($\pm 0,766$)	0,213 ($\pm 0,046$)	0,051 ($\pm 0,011$)	0,033 ($\pm 0,007$)	0,895	0,220	34	10
6	28,578 ($\pm 1,626$)	0,270 ($\pm 0,104$)	0,052 ($\pm 0,015$)	0,032 ($\pm 0,008$)	0,893	0,242	25	10,12,15,17
7	29,115 ($\pm 0,587$)	0,174 ($\pm 0,035$)	0,048 ($\pm 0,009$)	0,022 ($\pm 0,005$)	0,906	0,168	39	10
8	26,112 ($\pm 2,080$)	0,342 ($\pm 0,130$)	0,119 ($\pm 0,024$)	0,043 ($\pm 0,013$)	0,890	0,402	27	10,12,15
9	28,131 ($\pm 0,491$)	/	0,037 ($\pm 0,005$)	0,009 ($\pm 0,003$)	0,904	0,083	22	10,12,16,17
10	29,982 ($\pm 0,473$)	0,129 ($\pm 0,028$)	0,032 ($\pm 0,005$)	0,012 ($\pm 0,003$)	0,896	0,092	26	10,12

* redni brojevi rastvara a prikazani su u tabeli 7


Na osnovu dobijenih vrednosti regresionih koefficijenata izrađeni su procentni udeli pojedinih parametara i rezultati su predstavljeni u tabeli 9. Dobijeni rezultati korelacije po jedna i 2 koji su prikazani u tabelama 8 i 9 ukazuju na to da su najdominantnije disperzione interakcije između ispitivanih derivata i korišćenih rastvora, dok su dipolne interakcije kao i mogunost građenja vodoniknih veza zastupljene u mnogo manjoj meri.

Tabela 9 – Procentni udeli parametra po jedna i 2

jedinjenje	Pd(%)	Pp(%)	Ph(%)
1	80,17	11,03	8,79
2	79,00	11,79	9,21
3	72,54	16,12	11,34
4	73,31	15,76	10,93
5	71,72	17,17	11,11
6	76,27	14,69	9,04
7	71,31	19,67	9,02
8	67,86	23,61	8,53
9	0,00	80,43	19,56
10	74,57	18,50	6,94

3.2. Uticaj supstituenta na apsorpcione spektre derivata uracila

Apsorpcioni spektri svih ispitivanih derivata novosintetisanih derivata uracila u etanolu, prikazani su na slici 5.



Slika 5 – Apsorpcioni maksimumi ispitivanih derivata uracila u etanolu

Sličan izgled apsorpcionih spektara dobijen je i u ostalim korišćenim rastvarima. Prisustvo svih supstituenti na benzenovom prstenu dovode do manjeg ili većeg batochromnog pomeranja apsorpcionih maksimuma u odnosu na nesupstituisano jedinjenje ($R = H$) što vidimo na slici 5 i podataka prikazanih u tabelama 2 i 3. Sa povećanjem sposobnosti supstituenta za odavanje elektrona ($-CH_3 < -OCH_3 < -OH$) u rastvor se veće

pomeranje apsorpcionog maksimuma ka većim talasnim dužinama tj. u batochromno pomeranje. Isti trend se uči u svim ispitivanim sposobnostima supstituenata ka primanju elektrona ($-F < -I < -Cl \sim -Br < -COCH_3 \ll -NO_2$).

Kvantitativno se uticaj supstituenta, odnosno uticaj hemijske strukture ispitivanih derivata na njihovo spektralno ponašanje može tumačiti primenom Hammett-ove jednačine, korelacijom apsorpcionih frekvencija, ν_{max} , sa konstantom supstituenta, σ_p :


$$\nu_{max} = \nu_0 + \rho \cdot \sigma_p \quad (3)$$

gde je: ν - reakciona konstanta koja predstavlja merilo osetljivosti reakcije na efekat supstituenta, ρ - konstanta supstituenata koja opisuje elektronske efekte supstituenta kada se nalazi u para položaju u molekulu. Brojane vrednosti Hammett-ove konstante supstituenta [26] date su u tabeli 10.

Tabela 10 – Vrednosti Hammett-ove konstante supstituenta, ρ

supstituent	ρ
H	0,00
F	0,06
Cl	0,23
Br	0,23
I	0,18
COCH ₃	0,50
NO ₂	0,78
CH ₃	-0,17
OCH ₃	-0,27
OH	-0,37

Na slici 6 je prikazana korelacija konstante supstituenata, ρ sa apsorpcionim frekvencijama, ν_{max} dobijenim u vodi kao rastvara u.



Slika 6 – Zavisnost apsorpcionih frekvencija, ν_{max} , od konstante supstituenata, σ_p , u vodi

Uočavaju se dve odvojene linearne zavisnosti između koreliranih veličina. Jedna korelira elektron-donore, a druga elektron-akceptore uz odstupanje vrednosti za 4-COCH_3 kao supstituent. Koefficijenti dobijenih linearnih korelacija za sve ostale rastvare su predstavljeni u tabelama 11 i 12.

Tabela 11 – Koefficijenti linearne korelacije za elektron-donorske supstituente

rastvara i	$\alpha (10^3, \text{cm}^{-1})$	$(10^3, \text{cm}^{-1})$	R	sd
voda	35,126	5,620	0,948	0,366
etanol	34,031	4,027	0,964	0,214
metanol	34,175	4,604	0,965	0,240
n-propanol	34,017	4,271	0,961	0,237
i-propanol	34,022	4,343	0,961	0,242
acetonitril	33,871	3,142	0,920	0,258
n-heksan	31,718	0,919	0,976	0,039
n-heptan	31,843	1,228	0,974	0,055
n-butanol	34,135	4,939	0,978	0,201
n-pentanol	33,812	3,773	0,923	0,304
dioksan	33,664	3,154	0,969	0,154
DMSO	34,465	4,209	0,921	0,344
i-butanol	34,089	4,808	0,975	0,212
t-butanol	34,006	4,844	0,974	0,215
sir etna kiselina	34,144	4,010	0,964	0,212
DMF	34,663	4,719	0,941	0,329
Hloroform	33,367	2,442	0,946	0,162

Tabela 12 – Koefficijenti linearne korelacije za elektron-akceptorske supstituente

rastvara i	$\alpha (10^3, \text{cm}^{-1})$	$(10^3, \text{cm}^{-1})$	R	sd
voda	35,834	-8,395	-0,953	0,826
etanol	34,903	-7,756	-0,939	0,883
metanol	35,011	-7,507	-0,939	0,856
n-propanol	34,924	-8,009	-0,940	0,905
i-propanol	34,933	-7,803	-0,941	0,872
acetonitril	34,786	-7,340	-0,933	0,879
n-butanol	34,872	-7,912	-0,952	0,785
n-pentanol	34,629	-7,517	-0,917	1,012
dioksan	34,482	-7,548	-0,950	0,773
DMSO	35,460	-8,278	-0,955	0,793
i-butanol	34,809	-7,846	-0,950	0,797
t-butanol	34,757	-7,861	-0,951	0,793
sir etna kiselina	34,954	-7,772	-0,945	0,832
DMF	35,578	-8,296	-0,961	0,741
Hloroform	34,613	-7,505	-0,952	0,746

Reakciona konstanta α predstavlja merilo osetljivosti reakcije na efekat supstituenta. Ako su vrednosti reakcione konstante velike, bilo da su pozitivne ili negativne, onda to ukazuje na značajne promene nanelektrisanja na centralnom atomu funkcionalne grupe. Na osnovu dobijenih rezultata, prikazanih u tabelama 11 i 12, uočava se da se za elektron-akceptore kao supstituente dobijaju veće vrednosti za reakciju konstantu (tabela 10), u poređenju sa onim vrednostima dobijenim za elektron-donorske supstituente (tabela 12). Ovo ukazuje na injenicu da na spektralno ponašanje ispitivanih derivata uracila veći uticaj imaju supstituenti koji poseduju mogunost primanja elektrona.

4. ZAKLJUČAK

U ovom radu ispitivan je uticaj prirode rastvara i supstituenta na apsorpcione spektre novosintetisanih derivata 6-(4-supstituisanih fenilimino)metil uracila. U cilju toga snimljeni su apsorpcioni spektri ispitivanih jedinjenja u opsegu od 200 nm do 500 nm u 17 različitih rastvara a: metanol, etanol, n-propanol, i-propanol, n-butanol, i-butanol, t-butanol, sir etna kiselina, n-pentanol, deionizovana voda, acetonitril, n-heksan, n-heptan, dioksan i dimetil sulfoksid (DMSO), N,N-dimetilformamid (DMF) i hloroform.

Apsorpcioni spektri ispitivanih derivata uracila u oblasti od 200 nm do 500 nm u svim rastvarima imaju pokazuju dva apsorpciona maksimuma. Jedan apsorpcioni maksimum oko 220 nm, a drugi između 285 i 355 nm. Sa povećanjem polarnosti rastvara dolazi do hipsochromnog pomeranja apsorpcionih maksimuma. Solvatochromizam ispitivanih derivata tumačen je primenom Kamlet-Taft-ovog solvatochromnog modela. Dobijeni rezultati pokazuju da se očekuje hipsochromno pomeranje apsorpcionih maksimuma sa porastom polarizabilnosti, kiselosti i baznosti rastvara a u slučaju svih ispitivanih derivata sem za molekul koji ima 4-NO_2 supstituent za koji nije dobijena dobra korelacija. Polarizabilnost rastvara a ima najveći uticaj, dok kisele i bazne osobine rastvara a u dosta manjoj meri imaju uticaj na solvatochromno ponašanje ispitivanih molekula. Korelacija dobijenih apsorpcionih maksimuma sa Hansen-ovim parametrima rastvara pokazuju da su najdominantnije disperzije interakcije između rastvara i korisnih rastvara a, dok građenje vodoniknih veza i dipolne interakcije su zastupljene sa veoma malim udelima.

Ispitivanjem uticaja supstituenta na apsorpcione spektre 6-(4-supstituisanih fenilimino)metil uracila dokazano je da svi supstituenti dovode do manjeg ili većeg bathochromnog pomeranja apsorpcionih maksimuma. Sa povećanjem sposobnosti supstituenta za odavanjem ili primanjem elektrona uočava se veće pomeranje apsorpcionog maksimuma.

muma ka ve im talasnim dužinama. Utvrđeno je da elektron-akceptori kao supstituenti imaju mnogo veći uticaj na spektralno ponašanje ispitivanih derivata u odnosu na prisustvo elektron-donorskih supstituenata na benzenovom prstenu.

Zahvalnica

Ovi rezultati su deo projekta OI-172013 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

5. LITERATURA

- [1] J.F.Henderson, A.R.P.Paterson (1973) Nucleotide Metabolism, Academic Press, New York.
- [2] A.M.Michelson (1963) The Chemistry of Nucleosides and Nucleotide, Academic Press, New York.
- [3] W.H. Prusoff, D.C. Ward (1976) Nucleoside analogs with antiviral activity, Biochem Pharmacol, 25(11), 1233-1239.
- [4] R. Nencka, I. Votruba, H. Hebebecký, E. Tloušťová, K. Horská, M. Masojídková, A. Holý (2006) Design and synthesis of novel 5,6-disubstituted uracil derivatives as potent inhibitors of thymidine phosphorylase, Bioorg. Med. Chem. Lett., 16(5), 1335-1337.
- [5] F. Corelli, M. Botta, A. Lossani, S. Pasquini, S. Spadari, F. Focher (2004) Microwave-assisted synthesis and biological evaluation of novel uracil derivatives inhibiting human thymidine phosphorylase, Farmaco, 59 (12), 987-992.
- [6] E. Matyugina, A. Khandazhinskaya, L. Chernousova, S. Andreevskaya, T. Smirnova, A. Chizhov, I. Karpenko, S. Kochetkov, L. Alexandrov (2012) The synthesis and antituberculosis activity of 5'-nor carbocyclic uracil derivatives, Bioorg. Med. Chem., 20 (22), 6680-6686.
- [7] S.M. El-Assouli (1985) The molecular basis for the differential sensitivity of B and T lymphocytes to growth inhibition by thymidine and 5-fluorouracil, Leukemia Research 9 (3), 391-398.
- [8] M. González-Barón, J. Feliu, I. de la Gándara, E. Espinosa, A. Colmenarejo, B. Martínez-Martínez, E. Blanco, C. García-Girón, F. Juárez, P. Garrido, A. Ordóñez, P. Zamora (1995) Efficacy of oral tegafur modulation by uracil and leucovorin in advanced colorectal cancer. A phase II study, Eur. J. Cancer, 31 (13), 2215-2219.
- [9] C. Villanueva, L. Chaigneau, A. Dufresne, A. Thierry Vuillemin, U. Stein, M. Demarchi, F. Bazan, T. N'Guyen, X. Pivot (2011) Phase II trial of paclitaxel and uracil-tegafur in metastatic breast cancer. TEGATAx trial, The Breast 20 (4), 329-333.
- [10] G.A. Kim, Y. Sun, J.G. Song, H. Bae, J.H. Kim, S.T. Kwon (2009) Properties of cold-active uracil-DNA glycosylase from Photobacterium aplysiae GMD509, and its PCR application for carryover contamination control, Enzyme Microb. Tech., 44(5), 263-268.
- [11] P. Koistinen, E. Eerola, J.A. Vilpo (1987) Uracil-DNA glycosylase activity in human acute leukemia, Leukemia Res., 11 (6) 557-563.
- [12] P. Koistinen, E. Eerola, J.A. Vilpo (1986) Uracil-DNA glycosylase activity in chronic lymphoproliferative disorders, Leukemia Res., 10 (11), 1307-1311.
- [13] M. Goodarzi, M.P. Freitas, R. Jensen (2009) Ant colony optimization as a feature selection method in the QSAR modeling of anti-HIV-1 activities of 3-(3,5-dimethylbenzyl)uracil derivatives using MLR, PLS and SVM regression, Chemom. Intell. Lab. Sys., 98 (2), 123-129.
- [14] V. Malik, P. Singh, S. Kumar (2006) Unique chlorine effect in regioselective one-pot synthesis of 1-alkyl-allyl-3-(o-chlorobenzyl) uracils: anti-HIV activity of selected uracil derivatives, Tetrahedron, 62 (25), 5944-5951.
- [15] X. Xu, S. Chen, W. Tang, Y.J. Qu, X. Wang (2013) Synthesis and Application of Uracil Derivatives as Novel Thermal Stabilizers for Rigid Poly(vinyl chloride), Polym. Degrad. Stabil., 98, 659-665.
- [16] J.P. Stewart (2007) Optimization of parameters for semiempirical methods V: Modification of NDDO approximations and application to 70 elements, J. Mol. Mod., 13 (12), 1173-1213.
- [17] A. Pedretti, L. Villa, G. Vistoli (2004) VEGA – An open platform to develop chemo-bio-informatics applications, using plug-in architecture and script programming, J. Comput. Aid. Mol. Des. 18 (3), 167-173.
- [18] Gaussian 03, Revision C.02, M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, J.A. Montgomery, T. Vreven Jr., K.N. Kudin, J.C. Burant, J.M. Millam, S.S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J.E. Knox, H.P. Hratchian, J.B. Cross, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R.E. Stratmann, O. Yazyev, A.J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J.W. Ochterski, P.Y. Ayala, K. Morokuma, G.A. Voth, P. Salvador, J.J. Dannenberg, V.G. Zakrzewski, S. Dapprich, A.D. Daniels, M.C. Strain, O. Farkas, D.K. Malick, A.D. Rabuck, K. Raghavachari, J.B. Foresman, J.V. Ortiz, Q. Cui, A.G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B.B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R.L. Martin, D.J. Fox, T. Keith, M.A. Al-Laham, C.Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P.M.W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M.W. Wong, C. Gonzalez, J.A. Pople, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2004.
- [19] A. Anti-Jovanović (2006) Molekulska spektroskopija-spektrohemski aspekti, Fakultet za fiziku hemiju, Beograd.
- [20] Ch.Reichardt (2003) Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, Third, Updated and Enlarged Edition:WILEY – VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim.
- [21] M.J. Kamlet, J.M. Abboud, M.H. Abraham, R.W. Taft (1983) Linear solvation energy relationships. 23. A comprehensive collection of the solvatochromic parameters, p^* , a , and b , and some methods for simplifying the generalized solvatochromic equation, J. Org. Chem., 48, 2877-2877.

- [22] M.J. Kamlet, R.W. Taft (1976) The solvatochromic comparison method. 1. The beta-scale of solvent hydrogen-bond acceptor (HBA) basicities, *J. Am. Chem. Soc.*, 98 (2), 377-383.
- [23] M.J. Kamlet, J.L.M. Abboud, R.W. Taft (1977) The solvatochromic comparison method. 6. The π^* scale of solvent polarities, *J. Am. Chem. Soc.*, 99(18), 6027-6038.
- [24] R.W. Taft, J.L.M. Abboud, M.J. Kamlet (1981) Solvatochromic comparison method. 20. Linear solvation energy relationships. 12. The d term in the solvatochromic equations, *J. Am. Chem. Soc.* 103 (5), 1080-1086.
- [25] Ch.M. Hansen (2007): Solubility parameters, Lavoisie CRC Press, Inc., Boca Raton FL.
- [26] L.P. Hammett (1937) The Effect of Structure upon the Reactions of Organic Compounds. Benzene Derivative, *J. Am. Soc.* 59, 96-103.

ABSTRACT

STUDYING OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF NEWLY SYNTHESIZED URACIL DERIVATIVES

Uracil derivatives are potentially biologically active compounds, so the investigation of their physical and chemical properties is very important for their further application. In this work a series of newly synthesized derivatives of uracile was investigated by applying the spectrophotometric method. The absorption spectra were recorded in seventeen solvents with different properties. The effect of solvent was interpreted by Kamlet-Taft solvatochromic model. The dominance and the types of interactions that occur between the investigated derivatives and solvent were interpreted by applying the multiple linear correlation obtained values of absorption maxima and Hansen's solvent parameters. In addition to the effect of solvent, the influence of substituents in the molecule on absorption spectra was studied by applying Hammett equation.

Keywords: uracil derivatives, solvatochromism, effect of substituents, spectrophotometry, correlation analysis

Scientific paper

Paper received: 12. 03. 2015.

Paper accepted: 23. 04. 2015.

Paper is available on the website: www.idk.org.rs/casopis